

MONOVIN C: O SEU REBANHO NOS TRILHOS DO SUCESSO

INDICAÇÕES DE USO

HIPOVITAMINOSE C

Decorrente de defeitos na síntese ou na absorção da vitamina C.

RECUPERAÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS

Como suporte ao sistema imunológico altamente exigido para combater agentes causadores de doenças.

PERÍODO DE TRANSIÇÃO

Como suporte ao período caracterizado por intensas mudanças fisiológicas e potenciais disfunções metabólicas.

HEMORRAGIA OU FEBRE

Como terapia complementar ao fortalecimento das funções de defesa do organismo contra lesões ou inflamações.

HIPOCALCEMIA PUERPERAL

Os distúrbios no metabolismo do cálcio podem levar a complicações no parto e no período pós-parto.

ABORTO RECORRENTE

Como medida preventiva ou coadjuvante no tratamento contra ocorrências repetidas de aborto.

Auxilia na absorção de ferro
Transforma o ferro circulante em formas altamente biodisponíveis.

Fortalece o sistema imune
Melhora a resposta do organismo às injúrias e infecções.

Estimula a síntese de colágeno
Participa da integridade da pele e das articulações, cartilagens e tendões.

Ação antioxidante
Previne danos celulares causados por radicais livres em todos os sistemas, inclusive o cerebral e o reprodutivo.

Saiba mais sobre os benefícios de Monovin C

Consulte o Médico Veterinário



DOSAGEM

Adultos

20 mL, durante 5 a 6 dias.

Bezerros

10 mL, durante 5 a 6 dias.

A posologia pode ser alterada a critério do Médico Veterinário.

MODO DE USAR

Aplicação de injeções intramusculares ou endovenosas.

COMPOSIÇÃO

Cada 1 mL contém 150 mg de vitamina C.

APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola de 20 mL.

